

## تحديد الظروف المثلث لانتاج انزيم الكايتينيز من خميرة *Saccharomyces cerevisiae*

شذى سلمان حسن\*

ميس عماد احمد\*

استلام البحث 15، حزيران، 2009  
قبول النشر 28، كانون الاول ، 2009

### **الخلاصة:**

تم الحصول على 5 عزلات من خميرة *Saccharomyces cerevisiae* ودرست قدرة العزلات على انتاج الكايتينيز، واظهرت نتائج الغربلة الكمية ان العزلة *Saccharomyces cerevisiae S4* هي الاكثر انتاجا حيث بلغت الفعالية النوعية 1.9 وحدة/ملغم بروتين. زرعت الخميرة في اوساط تختمر صلبة وسائلة استخدمت فيها مواد نباتية مختلفة (مضافا اليها الكايتين)، اما الاوساط السائلة فقد احتوت على بعض الاملاح فضلا عن مواد نتروجينية مختلفة. تمت دراسة الظروف المثلث لانتاج انزيم الكايتينيز من درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني، ومدة الحضانة، وتركيز الكايتين. بينت النتائج ان اعلى فعالية نوعية كانت عند الوسط السائل الحاوي على الجيلاتين مصدرا نتروجيني عند 30°C وعند الرقم الهيدروجيني 6، و1% من الكايتين الغروي.

**الكلمات المفتاحية:** انزيم الكايتينيز، خميرة ، *Saccharomyces cerevisiae*

### **المقدمة:**

amine ولهذه المركبات اهمية في انتاج مواد كيميائية وعقاقير طبية فضلا عن استعماله في صناعة المنتجات الغذائية.  
لقد حظي الكايتينيز المنتج من البكتيريا والفطريات باهمية كبيرة في تحطيل هياكل الحشرات وازالتها من البيئة فضلا عن المجالات الطبية والعلجية مثل استخدامها في علاج الامراض الفطرية [5]. (Antifungal drug)

يعد انزيم الكايتينيز من انزيمات التحلل المائي (E.C.3.2.1.14) وينتج من كثير من الكائنات الحية مثل البكتيريا، والخمائر، والفطريات، والقشريات. تقسم هذه الانزيمات على وفق طبيعة عملها وتكسرها للأوامر الى: الكايتينيز الداخلي endochitinase حيث يعمل على تكسير الاوامر الكلايكوسيدية لسلسل الكايتين، والكايتينيز الخارجي exochitinase الذي يكسر الاوامر الطرفية للسلسل محرا وحدات السكر الثنائي GLENAe [2,1].

اشارت الدراسات ان الكايتينيز المنتج من خميرة *Saccharomyces cerevisiae* يتجمع في الفسحة البلازمية البينية periplasmic space ويعتقد ان له دور في عملية انقسام خلايا الخميرة [3].

ان اول من درس توصيف الكايتينيز في خميرة *Saccharomyces cerevisiae* هو الباحث Correa [4] حيث عين تسلسل الاحماض الامينية للانزيم وأشار الى ان البروتين يحوي على اوامر وتحوي على سيرسن/وثريونين وعلى مجموعة كاربوكسيل. ومعظم الانزيم ينتج ويفرز من قبل الخلايا في وسط التنمية. يتأثر انتاج الانزيم بعوامل عديدة منها: مكونات الوسط الزراعي ودرجة الحرارة والرقم الهيدروجيني وغيرها كما تتأثر فعالية الانزيم بالظروف المحيطة من درجة الحرارة والابيونات والرقم الهيدروجيني. واستعملت الانزيمات المحللة N-acetyl glucose لانتاج السكر للكايتين لانتاج السكر

**المواد وطرق العمل:**  
تم الحصول على 5 عزلات جاهزة من خميرة *Saccharomyces cerevisiae* من نماذج خميرة الخبز من الاسواق المحلية، واجريت بعض الاختبارات والفحوصات التشخيصية لهذه السلالات وتضمنت:

**صفات المزرعة:** درست صفات المزرعة لعزلات الخميرة لتتميتها على وسط YEPD الصلب وحضنها بدرجة 30°C لمدة 48 ساعة ولوحظ شكل المستعمرات ولونها وقوامها وارتفاعها ورائحتها وغيرها من الصفات للتتأكد من تشخيصها [6].

**الفحص المجهرى:** اجري الفحص المجهرى لملحوظة اشكال الخلايا وتجمعاتها وطرق تكاثرها بمزج جزء من المستعمرات مع قطرة من صبغة المثيل الازرق على شريحة زجاجية ثم وضع عليها غطاء الشريحة وفحصت بالمجهر بقوة تكبير (40 X).

\* كلية العلوم / قسم علوم الحياة

- فصلت الخلايا بنبذها بجاز النبذ المركزي بسرعة 4500 دورة بالدقيقة لمدة ربع ساعة لكل مدة حضانة ثم قيست الفعالية الانزيمية وتركيز البروتين في الرائق المتكون على التوالي.
- 2 تأثير درجة الحرارة في انتاج الكايتينيز: نشطت الخميرة بزرعها في وسط المرق السائل YEPD وحضنت بدرجة 30°C لمدة 18 ساعة. لقح وسط الانتاج السائل ب 2 ملليلتر من عالق الخميرة وحضنت بدرجات حرارية مختلفة (20 و 25 و 30 و 35°C) لمدة 6 ايام ثم استخلاص الانزيم من المزرعة بعد نبذها وقيست الفعالية الانزيمية وتركيز البروتين.
- 3 تأثير الرقم الهيدروجيني في انتاج الكايتينيز: نشطت الخميرة في الوسط السائل وحضنت بدرجة 30°C لمدة 18 ساعة. لقح وسط الانتاج السائل المحضر بارقام هيدروجينية مختلفة تراوحت بين 4-10 ب 2 ملليلتر من عالق الخميرة ثم حضنت بدرجة 30°C لمدة 6 ايام. رسست الخلايا وقيست الفعالية الانزيمية وتركيز البروتين وحسبت الفعالية النوعية في الرائق.
- 4 تأثير تركيز الكايتينيز: حضر وسط الانتاج بتراكيز مختلفة من الكايتينيز تراوحت من (0.5-1.5%) ثم لقح ب 2 ملليلتر من لقاح الخميرة وحضن بدرجة 30°C لمدة 6 ايام. فصلت الخلايا بالنبد المركزي وقيست الفعالية الانزيمية وتركيز البروتين في الرائق المتكون.

### النتائج والمناقشة:

تبينت سلالات الخميرة الخمسة في قدرتها على انتاج الكايتينيز في الاوساط الصلبة واظهرت ايضاً تفاوتاً في الانتاج في وسط الكايتين السائل جدول (1). بينت النتائج ان انتاجية الانزيم من هذه السلالات تتراوح بين 1-1.9 وحدة/ملغم بروتين وتميزت سلالة الخميرة *Saccharomyces cerevisiae S4* بانتاجية أعلى من غيرها ربما تعود الى نشاط الجينات المسؤولة عن تشفير الانزيم. وجد ان خميرة *Kluyveromyces lactis* قد انتجت 0.9 وحدة/ملغم بروتين في وسط الكايتين السائل عند حضنها بدرجة 28°C لمدة 7 ايام [11]. اشارت نتائج دراسات أخرى الى اختلاف الانتاج من الانواع والسلالات المختلفة مثلاً سلالة بكتيريا *Enterobacter aerogenes* التي انتجت الانزيم بفعالية 2.8 وحدة/ملغم بروتين [12] عند

### الاواسط المستخدمة في انتاج الكايتينيز:

#### 1- الاوساط السائلة المستعملة لتنمية

الخميرة وانتاج الانزيم [7]: استعمل الوسط السائل الحاوي على المكونات الأساسية الآتية مع تغيير المصدر النيتروجيني باذابة 0.5 غم NaCl و 1 غم MgSO<sub>4</sub> و 0.5 غم yeast Colloidal extract %0.5 و 0.5 غم K<sub>2</sub>HSO<sub>4</sub> و 1 غم chitin في 100 مل من الماء المقطر وعدل الرقم الهيدروجيني الى 6 وعمق الوسط بالموصدة.

حضرت الاوساط من المكونات المذكورة مع استبدال التربتون بمصادر نيتروجينية مختلفة هي: كازابين وبيتون وجيلاتين وبالتركيز نفسه %.5.

#### 2- وسط خلاصة الخميرة والبيتون

والدكستروز (YEPD) [8] يحتوي الوسط على المكونات الآتية: باذابة 20 غم كلوكوز و 10 غم yeast extract و 20 غم Trypton في الماء المقطر واكملاً الحجم الى لتر وعدل الرقم الهيدروجيني الى 5 وعمق بالموصدة حيث استخدم هذا الوسط في تنشيط وتشخيص وتنمية عزلات الخميرة.

#### 3- اوساط التخمر الصلبة:

حضرت الاوساط بوزن 15 غم من كل من نخالة الحنطة والذرة الصفراء المطحونة كلاً على حدة واضيف اليها 50 ملليلتر من الماء المقطر لترطيب الوسط مع اضافة 1% من الكايتين الغروي، ثم عدل الرقم الهيدروجيني الى 6، عقمت الاوساط بالموصدة لمدة ربع ساعة.

**استخلاص الانزيم:** تم استخلاص الانزيم من المزارع السائلة بعد نبذ المزرعة بسرعة 4500 دورة / دقيقة لمدة 15 دقيقة، اخذ الرائق الذي يمثل الانزيم الخام وقدرت فعالية الانزيم وتركيز البروتين وحسبت الفعالية النوعية (وحدة/ملغم بروتين). اتبعت طريقة [9] لتقدير الانزيم وطريقة [10] لتقدير البروتين.

### دراسة العوامل المؤثرة في انتاج الكايتينيز:

#### 1- مدة الحضانة:

نشطت الخميرة المنتجة ثم لقح وسط (YEPD) السائل المحتوي على 0.5% من الكايتين و 2 ملليلتر من عالق الخميرة. حضنت المزارع السائلة بدرجة 30°C لمدة زمنية تراوحت بين (3-7) ايام،

استخدمت تخرمات المواد الصلبة في هذه الدراسة لانتاج الانزيم لجوانب اهمها ملائمتها للنمو وكونها مواد طبيعية غنية بمتطلبات النمو مثل: الكربوهيدرات والبروتينات فضلاً عن انها مواد متوافرة بكل مناسبة ويمكن استعمالها لانتاج الانزيم بنطاق واسع.

استخدمت التخرمات الصلبة لانتاج العديد من الانزيمات والمواد المفيدة في الصناعات الغذائية مثل انتاج انزيم الاميليز من فطر *Aspergillus niger* عند تتميّتها على اوساط التخمر الصلبة شملت نخالة الحنطة والذرة الصفراء [16].

#### الظروف المثلثة لانتاج الكايتينيز :

1- درجة الحرارة: بعد ان حضنت الاوساط الملقحة بالعزلة *Saccharomyces cerevisiae S4* بدرجات مختلفة تراوحت بين 25-35 م°. بيّنت النتائج ان درجة الحرارة الافضل لانتاج الكايتينيز تكون عند 30 م° شكل (3) وبلغت الفعالية النوعية للانزيم في هذه الدرجة 1.5 وحدة/ملغم بروتينين وبدأت الفعالية بالانخفاض مع ارتفاع درجة الحرارة. تتفق هذه النتائج مع ما جاء به [17] بانتاج الكايتينيز من بكتيريا *Enterobacter Spp* حيث كانت 30 م° وفعالية نوعية للانزيم بلغت 1.2 وحدة/ملغم بروتينين. حيث ان لدرجة الحرارة تأثيراً مهما في انتاج وتركيب الانزيمات وارتفاع درجة الحرارة عن الحد المعين قد يؤدي الى موت الكائن وتوقف انتاج الانزيم وتغيير تركيب الانزيم وتثبيط عمله [18].

2- الرقم الهيدروجيني: لوحظ عند تتميّة عزلة *Saccharomyces cerevisiae S4* في وسط السائل بأرقام هيدروجينية مختلفة شكل (4) ان الرقم الهيدروجيني 6 كان الافضل لانتاج الانزيم واعطى انتاجية مقدارها 1.4 وحدة/ملغم بروتينين وكان افضل من بقية الارقام الهيدروجينية بينما كان الرقم الهيدروجيني الافضل لانتاج الكايتينيز من *Bacillus cereus* هو 7 [19]. في حين ان الرقم الهيدروجيني الافضل لانتاج الانزيم من *Pseudomonas aeruginosa* كان 5.5 [20].

3- مدة الحضانة: تمت متابعة انتاج الكايتينيز من العزلة اثناء مدة حضانة تراوحت بين 1-4 ايام. اظهرت نتائج ان اعلى انتاجية للانزيم كانت في اليوم الثالث من الحضانة وبلغت 1.8 وحدة/ملغم بروتينين شكل (5)، وبدأت نقل عند اليوم الرابع بينما كانت اعلى فعالية للانزيم من البكتيريا الخيطية *Streptomyces spp.* في اليوم الثاني

زرعها في وسط الكايتينين السائل وحضرتها بدرجة 30 م° لمدة 3 ايام.

#### جدول (1) انتاج انزيم الكايتينيز من خميرة *Saccharomyces cerevisiae*


الفعالية النوعية وحدة / ملغم بروتين	رمز العزلة
1	S1
1.2	S2
1.4	S3
1.9	S4
1.6	S5

A- انتاج الانزيم في اوساط التخمر السائلة لسلالة S4


استعملت اوساط سائلة تحتوي مصادر نتروجينية مختلفة في انتاج الكايتينيز بينت النتائج الموضحة في الشكل (1) ان اعلى فعالية نوعية كانت في الوسط الحاوي على الجيلاتين وبلغت 4.1 وحدة/ملغم بروتينين. واظهرت اوطأ انتاجية في الوسط الحاوي على التريبتون وكانت 0.94 وحدة/ملغم بروتينين.

يتضح من النتائج ان اضافة الجيلاتين الى الوسط يدعم نمو الخميرة وانتاج الانزيم بشكل افضل من بقية المصادر النتروجينية المستعملة وهو من المواد المشجعة للنمو التي يحتاجها الكائن. وتتلائم هذه النتائج مع نتائج دراسة اخرى استهدفت انتاج الكايتينيز من بكتيريا *Enterobacter Spp* استخدم فيها الوسط الحاوي على الجيلاتين وبلغت الفعالية النوعية 3.9 وحدة/ملغم بروتينين [13]. وتنتفق هذه النتائج مع ماذكره [14] الذي اثبت وجود فعالية واضحة للانزيم في وسط الجيلاتين لبكتيريا *Serratia marcescens*.


B- انتاج الانزيم في اوساط التخمر الصلبة : استعمل اثنان من اوساط التخمر الصلبة حضرت من مواد نباتية او مخلفاتها لمعرفة مدى ملائمتها لانتاج الكايتينيز من العزلة *Saccharomyces cerevisiae S4* حيث احتوت هذه الاوساط على الكايتينين بنسبة 1%. وقد اعطى وسط الذرة انتاجية اعلى قياساً بوسط النخالة شكل (2) وقد يرجع السبب الى احتوائه مواد كربوهيدراتية وبروتينية ملائمة لنمو الكائن وانتاج الانزيم حيث تحتوي بذور الذرة الداخلة في تكوين الوسط على 7-9% بروتين خام و 2% الياف النسا وسكر فضلاً عن عوامل النمو الاخرى [15].



شكل (3): تأثير درجات حرارة مختلفة (20-35 °C) في إنتاج الكايتينيز من خميرة *Saccharomyces cerevisiae S4*




شكل (4): تأثير الرقم الهيدروجيني في إنتاج الكايتينيز المنشىء جزئياً من الخميرة




شكل (5): تأثير مدة الحضانة في إنتاج الكايتينيز من الخميرة

عشر وبلغت الفعالية النوعية 1.1 وحدة / ملغم بروتين [21]. بينما ان انزيم الكايتينيز من بكتيريا *Enterobacter Spp.* تصعد على انتاجية في طور الثبات بعد 3 ايام من الحضانة وكانت 4.5 وحدة / ملغم بروتين [6].

4- تركيز الكايتين: درس تأثير تركيز الكايتين لانتاج الانزيم من بكتيريا *Saccharomyces cerevisiae S4* ولوحظ ان اعلى فعالية نوعية للانزيم هي 1.9 وحدة / ملغم بروتين شكل (6) عند وجود 2% من الكايتين الغروي في الوسط ثم تنقصت تدريجياً عند زيادة تركيز الكايتين الى 0.6 وحدة / ملغم بروتين عند تركيز 1.5 وحدة / ملغم بروتين وهذا ما اكده دراسة اخرى لانتاج الكايتينيز من خميرة *Saccharomyces cerevisiae* [22] بينما اشارت دراسة اخرى ان الانتاج الامثل للانزيم من *Bacillus cereus* تكون عند تركيز 0.5% من الكايتين [23]




شكل (1): تأثير المصادر النتروجينية المختلفة على إنتاج الكايتينيز من سلالة خميرة *Saccharomyces cerevisiae S4*



شكل (2): تأثير طبيعة الوسط الصلب في إنتاج الكايتينيز من خميرة *Saccharomyces cerevisiae S4*

6. Daihya, N; Rupinder, T; Ram, P.T. and Gurinda, S.H. 2005. Chitinase from *Enterobacter spp.*, its purification, characterization and reaction pattern. Electronic J. Biotech. 8 (5) :0717-3458.
7. Benhamous, N.; Gagne, S; Quere, D.L. and Degbi 2002. Bacterial mediated induced resistance in cucumber beneficial effect of the endophytic beneficial effect of the endophytic bacterium *Serratia plymuthica* on the protection against infection by *Pythium ultimum*. Phytopanol. 90 (1) ;45-56.
8. Magnelli, P.; Cipollie, J.F and Abeijon, C .2002. A refined method for the determination of *Saccharomyces cerevisiae* cell wall composition and b-1,6-glucan find structure. A.Biochem. 301 (8) ;136-150.
9. Boller,T, and Mauch,F and Vgelu 1988. Chitinase from *Phaseolusvulguris*, leaves, Meth, Enzymol, vol;161,pp. 479-484. Wood, W.A and Kellogg S.T(eds).Academic press
10. Lowry,O.H ; Roseberousgh ,N.T, Farr,A.L and Randall ,R.J.C .1951. protein measurement with the fold phenol reagent , J.Biol.511(3):231\_240
11. Pleban,S ;Chernin ,L .and Chet ,I .1997 Chitinolytic enzymes of an endophytic strain of *Bacillus cereus* Lettersin Applied Microbiology . September, vol; 4(2). 284-288.
12. Tanaka, T.T, Fukui, and T, Imanaka. 2000. Different cleavage specifites of the dul catalytic domains in chitinase from hyperthermophilic archaeon *Therococcus kodakaransis*. J.Biol.chem. 276(11) :3562-3565.
13. Karreman, R.J; Dague, E.; Gaborland, F; Quiles, F; Duval, J; and Lindsey, G.G 2006. the stress



شكل (6) تأثير تركيز الكايتين في انتاج الكايتينيز من الخميرة

#### المصادر:

1. Fekacuruz, J; Hidago, A; Lova, J.M.; Beniterz, T; Pintor-Toro,J and Liobell, A. 1992. Isolation and characterization of the three chitinase from *Trichoderma barzianum*. Eur. J. Biochem 206(4) :859-867.
2. Robbins, P.W.; Albright, C. and Benfield, B. 1988. Cloning and expression of *Streptomyces plicatus* chitinase in *Escherichia coli*. J.Biol.Chem. 263 (7):443-447.
3. Zlatkovic, D.; Jakovlige, D.; Zekovic, D. and Varvic, M.M. 2003. A glucan from active dry baker's yeast (*Saccharomyces cerevisiae*): A chemical and investigation of the structure. J.serb. chem. soc. 68(11):805-809.
4. Handric, L.W. 2002. Production of beta-glucan-mannan preparation by autolysis of cell under certain PH, temperature and time condition united state patent No. 644(12) :211-218.
5. Sakai, K.; Uchiyama, T.; Matahira, Y. and Nango, F. 1991. Immobilization of chitinolytic enzymes and continues production of N-acetylglucosamine with immobilized enzyme. J. Ferment. Bioengin. 72(3):168-172.

- 19.** Naja, G; Mustin, C. and Volesky, B. 2005. A high resolution; a new approach to studying binding site of microbial biosorbent. Water Research 39 (9):579-588.
- 20.** Folders, J.; Tommassen, L.; and Bitter, W. 2002. Identification of chitin binding protein secreted by *Pseudomonas aeruginosa* J. Bacterol. 182(8) :1257-1263.
- 21.** Wang, D.; Cooney, C.; Demain, A; Dunil Humphrey, A. and Lilly, M. 1979. Fermentation and enzyme technology. John Wiley, Inc. Canada.
- 22.** Van Aalten, D; Synstad, M; Brurbeg, B; Hough ,E; Rilse B; Eijsink, V and Wierenga, R.K. 2000. Structure of two domain chitotylosidase from *Serratia marcescens*. J. Bacterol. 255 (10):201-209
- 23.** Mabuchi, N; Hashizume , Janel Araki, Y. 2002. Characterization of the chitinase excretion of chitinase excreted by *Bacillus cereus*. Can.J.Microbiol, 46(7): 370-375.
- 14.** Vaage-Kolstad, G; Horn, S.J; VanAalten, D.; Sysntad, B; and E.jsint, V. 2005. The non catalytic chitin binding portion from *Serratia marcescens* essential for chitin degradation. J.Biol.Chem, 280 (1); 28492-28497.
- 15.** Acourene, S; Khalid, A; Bacha, A; Tama, M. and Taleb, B. 2007. Optimization of bakery yeast production cultivated O musts of dated. J. Appl.Sci.Res., 3(10):964-971.
- 16.** David, J. 2004. Fungal cell wall chitinase glucanase. Microbiol, 150 (11):2029-2035.
- 17.** Levin, D. 2005. Cell wall integrity signaling in *Saccharomyces cerevisiae*. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 69(2): 262-291.
- 18.** Green, A. 2005. Production of chitolytic enzyme by *Serratia marcescens* using various chitinase. J. Chem. Technol. Biotechnol. 80 (7):28-34.

## Detection of the Typical Condition of chitinase Production from the Yeast *Saccharomyces cerevisiae S4*

*Miaes Emad Ahmad\**

*Shatha Salman Hassan\**

\*College of science, Baghdad University.

### **Abstract:**

Five *Saccharomyces cerevisiae* isolated from the ability of chitinase production from the isolates were studied.

Quantitative screening appeared that *Saccharomyces cerevisiae S4* was the highest chitinase producer specific activity 1.9 unit/mg protein. The yeast was culture in liquid and solid state fermentation media (SSF). Different plant obstanases were used for (SSF) with the chitine, while liquid media contained chitine with the diffrented nitrogen source. The favorable condition for chitinase producers were incubated at 30 °C at pH 6 and 1% colloidal chitine.