

دراسة تصفيفية حول الجنس *Lycopus L.(Labiatae)* في العراق

ميسون خضر عباس البياتي*

تاريخ قبول النشر 1/3/2010

الخلاصة

تضمنت الدراسة المظهر الخارجي العام Gross morphology وحبات طلع النباتات - الطريقة المجموعة خلال السفرات الحقلية ، والجافة لمعظم العينات المحفوظة في المعائب العراقية - العائلة للجنس *Lycopus* L. ، وتشخيص الانواع غير المشخصة منها وتصحیح الخطاء الموجود فيها ، وتبعاً لذلك حدد للجنس النوع *L. europaeus* var. *glabrescens* *europaeus* L. فقط . وخلال هذا العمل عشر على الضرب Schmidely . وكانت حبات الطلع من الفئة المتوسطة الحجم ، وظهرت في المنظر الاستوائي الاهليجية الشكل Ellipsoid وفي المنظر القطبى سادسية الزوايا Hexagonal . حدّدت البيئة ونوعية التربة التي تعيش فيها نباتات الجنس ، وزُوّجت جغرافياً على المقاطعات الطبيعية العراقية الخاصة بكل منها ، واخذت الصور للتوضیح ورتبت بشكل لوحة ، فضلاً عن خريطة التوزیع الجغرافي للنبات

الكلمات المفتاحية: حبات طلع النبات ، *Lycopus L.*

المقدمة :

بان للجنس نوعاً واحداً في العراق وايران وتركمانستان وافغانستان وعموماً في اسيا واوربا ولكن المعلومات التي تقدم بها Mill حول الجنس *Lycopus* في الموسوعة النباتية التركية [10] عرفتنا على نوع واحد للجنس له نوعين وثلاثة ضروب معظمهما في اوربا وبعض من اسيا مثل تركيا وايران وسوريا ولم يذكر وجود نباتات الجنس في العراق علماً ان احدث المصادر المتوفّرة لدينا ذكرت وجود نوع واحد للجنس في اهوار العراق [11] ، ولكن نكمل ما بدأنا به من بحوث حول العائلة الشفوية في العراق [12] و [13] و [14] و [15] و [16] و [17] فضلاً عن دراسات لباحثين اخرين ولاجئات مختلفة من العائلة [18] و [19] والجنس احد افراد العائلة الذي يمكن ان تشكل دراسته الان قاعدة اساسية لدراسات صيدلانية مهمة لكونه نباتاً طبياً [20] و [21] له فوائد متعددة لم تدرس داخل القطر ، والمعلومات التي حصلنا عليها حوله ليست قليلة فحسب وانما متنبأة حتى في ذكر اسم النوع واعداد الانواع التابعة له وحتى ان بعض تلك الدراسات لم توكل وجوده في العراق ولاجل معرفة الحقائق العلمية عن هذا الجنس وتنبيه المعلومات الصحيحة عنه في الموسوعة النباتية العراقية ، ارتأينا ان نتقم ب لهذا البحث ولأول مرة على ان يتبع بدراسة شريحية ودراسة كروموموسمية في بحث لاحق . المجهرية .

نبذة تاريخية
يعود الجنس *Lycopus* الى العائلة الشفوية Labiateae وقد وصفه Linnaeus لأول مرة عام 1753 [1] واختار له هذا الاسم الذي في اللاتينية يدل على الوفرة ، واورد له نوعين احدهما ينتشر في اوربا والاخر في امريكا ، واعتمد Bentham [2] الاسم نفسه ، وأشار الى انه يضم حوالي عشرة انواع وفيها ضرب واحد او اكثر ، تنتشر كلها في المنطقة المعتدلة من العالم وفي امريكا الشمالية ، واتفق Boissier [3] مع Linnaeus على النوعين التابعين للجنس لكنه عدد دولاً وقارات تتوزع عليهما بنياتهما هي اوربا واستراليا وشمال افريقيا وبعض دول اسيا ، ولم يذكر وجودها في امريكا .اما Post [4] فقد ايد من سبقه بعدد الانواع لكنه اختلف معه باسم احدهما الذي كان قد وصفه Kerner عام 1866 وصححه Bornmeller فيما بعد في 1898 ، وبحسب Willis [5] فان للجنس اربعة عشر نوعاً تقع في الجهة الشمالية من المنطقة المعتدلة ، وارشدنا [6] Al-Rawi الى نوع واحد من نباتات الجنس موجودة في السليمانية ونينوى والمنطقة المنخفضة من العراق ، واكذ Rechinger [7] وجود النوع نفسه في الاراضي المنخفضة من العراق . وزاد Ridda و Daood [8] مناطق انتشار النوع نفسه في العراق على مقاطعات هي العمادية ، والتلال السفحية ، والسهل الشرقي ، والاهوار . وأعاد Rechinger في الموسوعة النباتية الايرانية [9]

الجافة ، واستعملت خريطة العراق التي اوردتها Guest [22] لتوزيع نباتات الجنس على مقاطعات العراق الجغرافية المتعددة.

النتائج :

1- وصف المظهر الخارجي للجنس *Lycopus* L.
Lycopus L., Sp. Pl. 1:21(1753); Benth. in Bentham & Hooker, Gen. Pl. 2 : 1183 (1876); Boiss. Fl. Or. 4 : 545 (1879); Rech. in Rechinger, Fl. Iran. 150:554 (1982).

نباتات عشبية معمرة برابيزومات Rhizomes تميزت بنظام جذري عرضي Adventitious root system ، فقد لوحظت الجذور العرضية الليفية الكثيفة التي تنشأ من عقد الساقان الرابيوزومية منتشرة تحت التربة ببطول تتراوح من (4-50) ملم وسمكها (0.5-4) ملم ، ذات الوان بيضاء مصفرة وبنية او بنية غامقة واحياناً بنية مسودة ، والسيقان رابيوزومية زاحفة فضلاً عن الهوانية القوية الراوية Quadrangular المنتسبةة والصادعة اطولها(90-120) سم وهي بسيطة وقد تتفرع بفروع عديدة قاعدية ، والوانها خضراء وبعضها بنية وقد تكون خضر مشوهة باللون البنبي او ارجوانية ، وهي وفروعها ملطفاء او ذات شعيرات بسيطة بعضها تصير ناعمة متباينة وآخرى طبولة من النوع Tomentose . والاوراق بسيطة مقابلة متصلة Decussate ذات تغابرات واضحة في شكل النصل فهي اما ببعضوية متاظولة او رمحية او اهلنجية مسننة خشنة Coarsely dentate ، او مقسمة ريشيا Pinnatisect او Pennatifid ، ذات شعيرات على السطحين او ملطفاء او تنشر الشعيرات على العروق فقط ، وتشابه الاوراق الساقية السفلية والوسطية مع العلوية والتي تمثل النقبات الا انها تختلف عن بعضها البعض في الابعاد حيث تقل ابعادها كلما اتجهت نحو القمة وكذلك في طول حاملها حتى تصبح جالسة في الاعلى. نوراتها ايطية Axillary تبدو سوارية كروية globose Verticillasters محشدة وعدد الازهار في السوار الواحد بين (20-36) زهرة. الكاس جرسية الشكل فيها عشرة عروق او ثلاثة عشر عرقاً ذات 4-5 اسنان متباوبة الاطوال او غير متباوبة ، او ذات فصوص مدورة او رمحية الى ممتدة ، والتوج بشفتين ، العليا في الغالب اعرض من السفلية ذات الفصوص الثلاثة ولون التوجيات عادة ابيض وفهما نقاط ارجوانية. والازهار ثنائية الجنس تمثاز بتباين في نضج اعضائها التناكرية فتوصف بالصطلاح Dichogamous flowers

المواد وطرق العمل:

اولاً- دراسة المظهر الخارجي العام
 اعتدت الدراسة على عينات نباتات طرية -

جمعت خلال ثلاث سفرات حلية للباحثة في ربيع وصيف وخريف 2005 و 2006 لمقطوعات العمادية وراوندوز والسليمانية وكركوك واريبل والسهل الشرقي وبعض المناطق المتداخلة مع مقاطعة التلال السفجية - ففظلت منها انماذجات نباتية في معشب الجامعة BUH في كلية العلوم - جامعة بغداد ، وعلى عينات جافة مودعة في المعشب الوطني العراقي BAG ومعشب كلية الزراعة BUA فضلاً عن معشب الجامعة في كلية العلوم ، حيث جرت دراسة كل عينة والتأكد من تشخيصها واعادة تشخيص البعض منها كما شخصت العينات غير المشخصة منه ، بالاستعانة بالمفاتيح والوصفات النباتية الواردة في بعض المصادر المتوافرة ، وفحصت الاجزاء النباتية المختلفة بصورة تفصيلية ودقيقة تحت مجهر التشريب نوع Zeiss . وبناءً على المعلومات التي حصلنا عليها حدّدت مراتب الجنس في العراق ووضعت الصور التوضيحية لمعظم الاجزاء النباتية.

ثانياً - دراسة حبات الطلع

ثبتت البراعم الزهرية الناضجة او الازهار حديثة الفتح في الحقل مباشرة بمحلول كارنوي وبقيت فيه لمدة حوالي 24 ساعة ثم غسلت بكمول اثلي 70 % وحفظت في الثلاجة بالتركيز نفسه لحين دراستها ، وكذلك اخذت حبات طلع من انماذجات نباتات مشخصة جافة بعد التأكد من سلامتها تصنيفها او اعادة تشخيصها ، ومن مناطق القطر المختلفة - وهي محفوظة في معشب جامعة بغداد - ووضع المتك في زجاجة ساعة واضيفت اليه قطرات من صبغة السفريانين - الكاليسرين (تمكّلة طريقة العمل وبحسب المصادر مذكورة بالتفصيل في [12] ومكررة في [16]) فحصلت الشرائح جيدة التحضر ، واخذت القياسات لـ 40 حبة طلع في المنظر الاستوائي وكذلك في المنظر القطبي باستخدام مقياس العدسة العينية Ocular micrometer ووصلت اشكال حبات الطلع وصورت في كل المنظرين الاستوائي والقطبي بكاميرا Digital من خلال المجهر الضوئي نوع Leica DME تحت العدسة الشبيهة 40 ونقلت الى الحاسبة الالكترونية.

لم تتمكن الباحثة من اجراء الدراسة باستخدام المجهر الالكتروني الماسح SEM بسبب معوقات كثيرة.

ثالثاً - دراسة البيئة والتوزيع الجغرافي
 حدد نوع البيئة التي تعيش فيها نباتات الجنس *Lycopus* في العراق من خلال الملاحظات الحلية ومن دراسة المعلومات الموجودة على رقع العينات

الكأس شعيرات بسيطة قصيرة متباعدة وتنشر كذلك على حافات الاسنان من الخارج ، أما اللهاة Throat فهي خالية من الشعيرات ، طول الكأس 2.5 - 4.5 ملم ، يصل طول انبوب الكأس الى 2.5 ملم وطول السن [1] - 1.5 - 2.5 [2] ملم وتنبع الكأس قليلاً عند تكروين البنيدقات وتبقى معها. وللتوجيه شترين وانبوه قصير يصل الى 2 ملم ويقع ضمن الكأس بينما يبرز طرفه قليلاً إذ يكون بطول (3) 2 ملم ، الشفة العليا بفصين متلحمين والسفلي بثلاثة فصوص ، الفص الوسطي اكبر من الفصين الجانبيين قليلاً ، لون التوجيه ابيض وفيه نقاط ارجوانية ولا سيما على الفص الوسطي للشفة السفلية والاسدية انتشار بارزتان خارج التوجيه تصل اطوال خوباتها [6-7] 10 ملم وقوعها تقع في منطقة اللهاة ، والمتوك تتصل انصالاً قلقاً من بين فصيها المتباudiين عن بعضهما ، وللمدقات اقلام متابعة قاعية ومياسم مشطورة ، لكل ميس شطرين غير متساوين ، والبنيدقات بنية اللون - بنية داكنة ملساء الى ملقاء بحافات متساوية صلبة بقمة مقطوعة وقاعدة ممتدة. واستناداً الى هذه الصفات التصنيفية امكن عزل نباتات الجنس في العراق على نوع واحد هو *L. euopaeus* L. *L. euopaeus* L. Var. *glabrescens* Schmidely

2-1 وصف النوع

L. euopaeus L., Sp. Pl. 1:21(1753); Post, Fl. Syr. Pal. Sin. 2 : 331 (1933); Rech. in Rechinger, Fl. Iran. 150:554-555 (1982).

للنبات سيقان قوية ومنتصرة وبسيطة عادة واطوالها من [20-60] سم [80] سم [لوحة 1-1] وقد تتفرع إلى فروع عديدة من ثلثها الاول وفرعية الى القاعدة ، وتلك السيقان وفروعها ذات اربع زوايا واربعة اخاذيد ، تنتشر عليها او على بعض اجزائها شعيرات قصيرة وطويلة ناعمة متباعدة نوعاً ما ومتناولة في اخاذيد الساق وقد تكون ملساء ، فضلاً عن السيقان الرأيزومية ذات الجنور العرضية اليافعة الثقيلة واوراقها الساقية بيضوية - بيضوية متراوحة او رمحية - اهليليجية ذات حذور العرضية خشنة [لوحة 2-1] او مقسمة ريشياً وقد تكون التقسيمات عميقية [لوحة 3-1] وفي بعض النباتات تكون الورقة مقسمة ريشياً من قاعدتها وتتصبح مسننة تدريجياً باتجاه قمتها ، وابعاد الاوراق السفلية [20-100] (150-50)x [60-10] ملم، قممها حادة وقوعها ممتدة ذات سويقات قصيرة قد تصل الى 3 ملم ، وتشبه الاوراق الساقية الطولية مع السفلية الا انها اصغر منها ، وتقل اطوال سويقاتها حتى تصبح جالسة ، وعليها شعيرات بسيطة قليلة متباعدة على السطح العلوي للورقة تزداد على السفلي منها. والثورات ابطية تبدو سوارية او لولبية بهيئة كروية محشدة [لوحة 4-1] على طول السيقان وفروعها ، والمسافة بين سوار واخر تصل (40-70) ملم تتناقص تدريجياً باتجاه قمة الساق. وعدد القبيبات ثلاثة ، واحدة كبيرة نسبياً بابعاد [3x1] (5-) ملم وانتشار صغيرتان متساويتا الابعاد تصل (0.5x1) ملم وشكلها شريطية - خطية Linear - مخرازية Subulate ذات شعيرات بسيطة تنتشر على حافاتها المستوية فقط. والكأس حرسية بخمسة اسنان متصبة متساوية الاطوال مثلثة - رمحية ذات اطراف مستدقه Acuminate - سفاتية Aristate وعلى

3-الضرب *L.euopaeus* Var. *glabrescens* Schmidely.

Mill, in Davis , Fl.Turkey 7:394-395(1982).

يشبه هذا الضرب النوع في صفاتة ولكن النصول Blades في اوراقه ملساء مع وجود شعيرات بسيطة ناعمة تنشر على العروق فقط ولا سيما عروق السطح السفلي - حفظت عيناته في متحف الجامعة في كلية العلوم وستوزع مكرراته على المعاشر الاجرى - لوحة 7-1

2-حبات الطلع


لواحظت حبات الطلع العائدة لنوع *L.euopaeus* ذات ستة اخاذيد Colpi تمترز بعدم احتواها على الغطاء والحبات من الفئة المتوسطة الحجم اذ لا يزيد معدل طول محورها القطبي على 37.5 مايكرومتر ، في حين يصل اقصى طول لحبات الطلع المتوسطة الفياسية 50 مايكرومتر على وفق ماجاء في Erdtman [23] ومكررة بالتصليل في [12] و [16] وكان معدل طول القطر الاستوائي (E) للحبة 27.5 مايكرومتر ومعدل طول المحور القطبي (P) 32.5 مايكرومتر في المنظر القطبي بينما كان معدل طول القطر الاستوائي للحبة 22.5 مايكرومتر ومعدل طول المحور القطبي 37.5 مايكرومتر في المنظر الاستوائي واستعمل P/E دليلاً على شكل حبات الطلع ، وقد كانت اهليليجية في المنظر الاستوائي بينما كانت سدايسية الزوايا في المنظر القطبي [لوحة 8a, 8-1] وكان معدل

عادة بشكل Clones (كлоن) في سنتين مقاطعة السليمانية (MSU) في ساراو وسرسیر واحد اوه وفي بياره وطويلة . وفي مقاطعة السهل الشرقي (LEA) وبعض المناطق المداخلة معها من مقاطعة التلال السفجية (FPPF) حيث انتشرت في القتوات الارواحية في سنتين بعقوبة وابي صيدا 10 كلم شرق الصدور وفي تربة حصوية قرب الماء وفي شيخ بابا كانت بشكل مجاميع سكانية كثيفة بحوالي 10 كلم باتجاه جلواء في منطقة مسترزة وتربيه حصوية قرب اشجار اليوكالبتوس وكذلك في الطريق من مفرق جلواء - كلار ، كما وجدت في مقاطعة السهل الاوسط (LCA) في البوسفية والحلة ، ثم كانت في بغداد في منطقة الحرية وعلى ضفاف دجلة ، وانتشرت مجاميع سكانية في مقاطعة الاهوار (LSM) في العمارة في الصحرين وكذلك باتجاه الجنوب من المجر الكبير (شكل 1) اما الارتفاعات التي ظهرت فيها نباتات النوع فقد تباينت كثيرا حيث نمت افرادها في مقاطعة الاهوار على ارتفاع لايزيد عن 5 متر فوق مستوى سطح البحر جنوب العمارة وعلى جبل سنجار في مقاطعة سنجار حيث وجدت على ارتفاع 700 متر فوق مستوى سطح البحر.

سمك جدار الحبة لايزيد على 2.5 ميكرو ميتر وزخرفتها البسطجية شبکية ، وبلغت اعلى نسبة منوية لحبات الطلع العقيمة 62% .

3-البيئة والتوزيع الجغرافي

من الملاحظات الشخصية للباحثة خلال السفرات الحقلية ومن دراسة معظم عينات الجنس المحفوظة في المعائب العراقية لأكثر من اربعة عقود من السنتين ، عرفت طبيعة البيئة التي تنمو فيها نباتات هذا الجنس في العراق فقد لوحظت نباتات الجنس *Lycopus* بشكل مجاميع سكانية واسعة الانتشار عادة حيث تنمو على ضفاف الانهار والبرك وحافات الجداول والقوتوات الارواحية وقرب ساقط المياه والشلالات ومضخات السقي ومشاريع مياه الشرب وفي الاهوار بين نبات الحلفا والقصب وفي السنتين تحت اشجار اليوكالبتوس واشجار الصنوبر والجوز وحتى بين الشقوق الصخرية وفي جوانب الطرق الجبلية ، في ترب مختلفة اذ وجدت في تربة طينية او مزيجية او حصوية رطبة وفي الصخور الكلسية ، فقد انتشرت افراد الجنس في مقاطعة سنجار (MJS) بين الصخور الكلسية في كرسى ، وظهرت افراده في منطقة الغابات من مقاطعة نينوى (FNI) وفي مقاطعة العادية (MAM) في سرسنك وسولاف وزاخو وفي الطريق المؤدي الى كانى ماسى ، وفي مدينة العمادية ، وشوهدت بشكل مجاميع سالية ()



لوحة (1) نبات *Lycopus*

- 1- في بيته الطبيعيه 2- الجندر العرضية والسيقان الاوراق المسننة 3- الاوراق عميقه التقسيم الرئيسي
- 4- النورة السوارية 5- الزهرة كاملة 6- البنيدة 7- الضرب 8- حبة الطلع في المنظر القطبى 8a - حبة الطلع في المنظر الاستوائي.

تعيش في المناطق المائية تكون اوراقها مقسمة ريشيا ، بينما التي تعيش في المناطق الجافة تكون اوراقها مسننة ، اذ وجدت دراستنا عينات مشبوبة لنباتات ذات اوراق مسننة وتعيش في المناطق المائية حيث جمعت من احد الاهوار التابعة للعمارة في جنوب المجر الكبير والمرقمة 46654 في المعشب الوطني ، وعينات اخرى من الصخرين في مقاطعة الاهوار ذاتها باوراق مقسمة ريشيا وهي في معشب الجامعة وبالرقم 0040582 [لوحة 3-1] لكنها بسيقان اوراق فقط وكان قد جمعها الموسوي والطيبي في 1973 ، وهي غير كافية للدراسة ، لذا ترتأي الباحثة تأجيل تاكيد ذلك لحين العثور على عينات طرية كاملة لتكميل دراسة هذا النوع فقد يكون نوعا جديدا . وللકأس اهمية تصنيفية في التعرف على النوع ، ولوحظ اتساعها قليلا في مرحلة تكون الشمار وبقائها مع البنيدقات فيكون لنسقط البنيدقات مع الكؤوس الشمرية اهمية في الحفاظ عليها من المؤثرات الخارجية وضمان عدم تلفها وبذلك تتحقق انتشارا واسعا ولو جود الن نقاط الارجوانية على التويج الابيض اهمية في تمييز النبات اما الاعضاء التكاثرية الذكرية فقد كانت لها اهمية في معرفة مميزات النوع لوجود سدتين خصبيتين فقط في حين اشتهرت معظم انواع الانناس العادنة للعائلة الشفرية بوجود اربع اسدية خصبة عادة بينما الاعضاء الانثوية ولاسيما البنياض فقد كانت اهميتها محدودة في هذه الدراسة لكثرة شبابها مع مميزات انواع اخرى لاجناس مختلفة من العائلة ذاتها ، وكان لحبات الطلح في الدراسات التصنيفية اهمية في فصل الانواع عن بعضها ، اذ عرفت في هذه الدراسة بسداسية الزوابيا في المنظر القطي ويمكن تمييزها عن انواع اخرى قد يتم العثور عليها في دراسات لاحقة ، فضلا عن التعرف على مميزات البنيدقات .

وللبينة دور اساسي في التصنيف النباتي ، ومن الضروري ملاحظة الصفات المظهرية التي ترتبط مع العوامل البينية المختلفة للربط بين التغيرات البينية وتاثيراتها في وصف ايota مرتبة تصنيفية Taxon ، كما ان لمعرفة التوزيع الجغرافي لاي جنس اهمية كبيرة في تحديد وعزل مراتب تصنيفية تصل لمترتبة النوع وتعد قاعدة في فهم اصل وهرة الانواع والاجناس [24] ولعل الترابط الواضح من خلال وجود العلاقات التصنيفية بين العديد من نباتات البحر المتوسط ومنطقة Irano - Turanian (شرح باسهاب في [12]) يفسر وجود نباتات الجنس *Lycopus* في العراق ، اذ يوجد في سوريا وفلسطين فضلا عن وجوده في تركيا وايران كما في نباتات الجنس *Eremostachys* في فلسطين بعد ان قدمت اليها منذ زمن طويل على

شكل 1- التوزيع الجغرافي للنبات *Lycopus*

L. europaeus Var. *glabrescens*

المناقشة :

ل TORTOGNO [10] اتى بنتائج دراسة تصفيفية مفصلة عن الجنس *Lycopus* في العراق ، وانما معلومات متباعدة وردت معظمها في الموسوعات النباتية للبلدان المجاورة ، وفيها اختفت اعداد انواع الجنس ، وذكرت انواع مرادفة ، وانواع لا تنمو في العراق ، مع عدم ثبات المرتبة التصنيفية من مصدر الى اخر ، لابل حتى ان بعض المصادر لم تذكر وجود نباتات الجنس في العراق ، مما جعلنا نقدم على اجراء هذه الدراسة للتعرف على وضع الجنس داخل النظر ، وقد وصف Mill في الموسوعة النباتية التركية [10] الجنس *Lycopus* وذكر له نوعا واحدا هو *L. europaeus* وثلاثة ضروب ولم يذكر وجوده في العراق ، لكن الدراسة الحالية اثبتت وجود النوع واحد من تلك الضروب لا اول مرة في مقاطعة العمادية . وعالج Rechinger [7] في الموسوعة النباتية الایرانية الجنس ووصف له نوعا واحدا لاحظ نباتاته في العراق ، وقد ايدت هذه الدراسة صحة وجوده ، وان كانت بعض الصفات التي ذكرها والمميزة للنوع لا تطبق على العينات العراقية لاعتماده في المعاملة التصنيفية عينات غير عراقية كانت تختلف بدرجات متفاوتة عنها ، وارشدننا AL-Rawi [6] الى النوع الموجود في العراق وهذا ما توصلت اليه دراستنا ، فالنوع هو *L. europaeus* الذي سماه Linnaeus [1] واستعمل الاسم الباحثين من بعده – وكما ذكر في المقدمة – وان كانت له اسماء اخرى مرادفة لانجد ضرورة هنا لتكلرارها وهي موجودة في [9] [10] .

تعد الاوراق من اكثر الاجزاء الخضرية عرضة للتغيرات من حيث الابعاد ، واشكال النصول وحافتها ، وقواعدها ، وقائمها ، لابل حتى تعرقها ، وكسانها السطحي ، مع ذلك اتضحت قيمتها التصنيفية في عزل المضرب var. *glabrescens* schmidely في العراق لاول مرة . ولم تتفق هذه الدراسة مع ماجاء به Mill [10] عندما ذكر ان النباتات التي

الماني الامريكي *L. virginicus* L. الذي عده العشابون ذات يوم بنته مخدرة معتدلة ، لذا يجب اخذه باشراف اخصاصي وعدم تناوله اثناء الحمل . [29]

المصادر:

- 1-Linnaeus, C.1753 Species plantarum. Vol.1:21.London .
- 2-Bentham,G.1876 Labiatae in : Bentham,G.& S.D.Hoaker,Genera plantarum , 2.Reeve &Co. ,Williams & Norgate,Londini,1279 pp.
- 3-Boissier,E.1879 Flora Orientalis Genevae et Basileae.A pud H.George.Bibliopolan Lugduni,4:545.1276 pp.
- 4-Post G.E1933 Flora Syria - Palestine& Sinai .American Press Beirut,2:331.926 pp.
- 5-Willis,J.C.1973 Adictionary of flowering plants & ferns,8 th.ed.Cambridge,University press . 1207 pp.
- 6- AL-Rawi , A.1964 Wild plants of Iraq , with their distribution .Dep. Agr.Iraq Tech.Bull.,14:232 pp.
- 7-Rechinger,K.H.1964 Flora of lowland Iraq . Verlag Von cramer,Wein.746 pp.
- 8-Ridda,Th.J.&W.H.Daood 1982 Geographical distribution of wild vascular plants of Iraq.National Herbarium of Iraq .140 pp.
- 9-Rechinger,K.H.1982 *Lycopus* L. in :Rechinger,K.H.,Flora Iranica. 150 Akademische Drucks Verlasantalt,Graz-Austria . p. 554- 555.
- 10-Mill,R.R.1982 *Lycopus* L.in: Davis, P.H.,Fora of Turkey & A gean Island.Edinburg Univ . press.7:394- 395 .
- 11-العباوي ، دنيا علي حسين 2009 دراسة بيئية للنباتات في اهوار العراق الجنوبيه اطروحة دكتوراه كلية العلوم /جامعة البصرة
- 12-البياتي ، ميسون خضر عباس2001 دراسة تصنيفية مقارنة لأنواع الجنانس *Mentha* L. و *Thymbra* L و *Micromeria* Bth و *Ziziphora* L و *Thymus* L.

انها نباتات زينة وهي نباتات تعود للعائلة الشفوية كذلك والآن بربة موجودة في العراق [16] . انتشرت نباتات نوع *L.europaeus* في مقاطعات مختلفة من القطر منها في المناطق الشمالية ومنها في الوسط وحتى في الجنوب ، ذات الترب المتغيرة والارتفاعات المتغيرة مما يدل على تميزها بالقدرة على التكيف البيئي ، وقد توضح اثر تلك الاجواء المختلفة في اشكال اوراق النبات المتغيرة وكسانها السطحي ، ويدو مما سبق ان النوع المذكور ينمو متى توافرت له المياه ، وفي اية تربة كانت عدا الصحراوية والكتبان الرملية ولكن الواقع اثبت ومن خلال الملاحظات الحقلية عدم نموه على ضفاف دجلة في بغداد حالياً مثلاً ، ولا في الطريق بين السليمانية وكركوك رغم وجود المياه ، وقد يكون السبب في احتمال ثلوث تلك المياه ، او سرعة جريانها او اكساء الصنف بالحجر . ان مدة ازهار نباتات النوع في العراق تبدا من حزيران وتمتد ولاسيما في مناطق المقاطعات الشمالية والوسطى لغاية تشرين الاول ، اما البذيدقات فت تكون منذ بداية اب ولغاية تشرين الثاني .

5- اسماء النبات واستعمالاته

من خلال اللقاءات الشخصية مع سكبة مناطق انتشار نباتات الجنس *Lycopus* عند اجراء السفرات الحقلية في المقاطعات الجغرافية الطبيعية وجدنا ان النبات غير معروف لديهم ، ومن المعلومات الموجودة على بعض رقع التلادج المعشبية الجافة ولاسيما تلك التي كتبها الرواية وكذا من مصادر متعددة حصلنا على اسماء النبات وفوانده ، فهو في العربية فراسيون ماني ويختلف عن الفراسيون العائد للجنس *Ballota* في النوع *B. nigra* L. وهذا هو الفراسيون الاسود ، وفي الايطالية *Erba-sega* ، وفي الانكليزية *Bitter horehound* و *bugle weed* وبالاسم الانكليزي *horehound* مع النوع *Marrubium vulgare* L. لكن الاخير هو لجنس اخر مختلف ويعرف بالعربية بالفراسيون الابيض ، وان كان الجنسان عاذرين للعائلة ذاتها اي الشفوية [25] و [26] ، ولنوع المدروس اسم اخر هو *Gipsywort* اي بنتة او عشب الغجر ، لان الغجر يستعملونه بكثرة سواء بالطيخ او في الطب الشعبي ، فهو لديهم مسكن او مهدئ وقابض ولالمعالجة الحمي [27] ولمستخلصات النبات فعالية مضادة لنفس البكتيريا ولاسيما تلك المقاومة للمضادات الحيوية [20] ولها اهمية في التأثير الاجابي على زمن تخثر الدم [21] و [28] . وللنبات فائدة في علاج الافراط في تناول الغدة الدرقية ، فضلاً عن كونه مقوياً للقلب ، ويؤخذ للخفقان وللتلقق ، وسمي كذلك بالعرصف الاورببي تميزاته عن العرقف الامريكي او الفراسيون

- 20** – Gibbons , S; Oluwatuyi , M; Veitch, N.& Gray , A. 2003 Bacterial resistance modifying agents from *Lycopus europaeus* L. Phytochemistry. Jan; 62 (1) : 83-7 .
- 21**- Shi, H; Gao, N; Li, Y; Yu, J; Fan, Q.& Bai,G.2002 Effects of active fractions from *Lycopus* L. Fo 4.Space- Med- Med- Eng. (Beijing) Oct. ,15 (5) :331-4.
- 22-** Guest , E1966 Flora of Iraq . Ministry of Agricultrue Republic of Iraq .1:213 pp.
- 23-** Erdtman , G. 1952 Pollen morphology and Plant taxonomy . Angiosperms .Almqvist & Wiksell , Stockholm . 539 pp.
- 24**- المشهداني ، عذية ناهي 2001 مراتب الجنس *Echium* L. النامية في العراق . مجلة دىالى للبحوث العلمية والتربويه ، المجلد الاول العدد العاشر 151-165 ص .
- 25-** Harding , J.2004 The Herb Bible . Parragon Publishing , UK. 256 pp.
- 26**-Linford,J.2007A pocket guid to herbs . Parrragon publishing, UK. -27-Bown , D. (1995) Encyclopaedia of Herbs and their uses . Dorling Kinders, London . 28-Tian , Z ;Gao,N;Li,L. & Yu, J.(2001) Effect of two extracted fraction from *Lycopus* on coagulation function . Zhong - Yao- Cai , Jul. 24 (7) :507-8 .
- 29**- شوفاليه ، اندره 2003 الطب البديل . التداوي بالاعشاب والنباتات الطيبة . ترجمة عمر الايوبي ، اكاديمية انترناشيونال ، بيروت – لبنان ..
- الشفوية في العراق . اطروحة دكتوراه كلية العلوم/جامعة بغداد.
- 13**-البياتي ، ميسون خضر عباس 2003 الخصائص التصنيفية والتشريحية للورقة في انواع طيبة مختارة من الاجناس *Mentha* L. و *Thymbra* L. و *Micromeria* Bth و *Ziziphora* L. و *Thymus* L. المجلة العراقية للعلوم ، المجلد 44 ب ، العدد 1:38-50 ص.
- 14**-البياتي ، ميسون خضر عباس والعمر ، مي محمد 2006 حبات طبع انواع من الجنس *Stachys* L. في العراق . مجلة ابن الهيثم للعلوم المجلد 19 ، العدد 2.
- 15**-هادي ، سالي محفوظ 2007 الفعالية التثبيطية للزيوت الطيسارة نباتات اكليل الجبل *Rosmarinus officinalis* L. في تثبيط الاحياء المجهرية الممرضة . رسالة ماجستير ، كلية العلوم /جامعة بغداد
- 16**-البياتي ، ميسون خضر عباس 2007 دراسة تصنيفية حول الجنس *Eremostachys* Bunge النامي في العراق . المجلة العراقية للعلوم ، المجلد 48 ، العدد 1:23-34 ص.
- 17** - البياتي ، ميسون خضر و زوكيان ، سلفا انترناشك 2008 العدد الكروسمي والتشريح الداخلي للورقة والساق في نوعي الجنس *Eremostachys* Bunge مجلة جامعة بابل ، المجلد 15 العدد 3-1166-1171 ص .
- 18**- الزبيدي، عادل موحان 1998 دراسة تصنيفية للاجناس *Marrubium* L. و *Ajuga* L. و *Lallemandia* Fisch & Mey و *Lamium* L. العائد للعائلة الشفوية في العراق . اطروحة دكتوراه كلية العلوم – جامعة بغداد .
- 19**- نصار الله ، اسراء كريم 2007 دراسة تصنيفية مقارنة للانواع البرية للجنسين *Phlomis* L. و *Sideritis* L. من العائلة الشفوية *Labiateae* . اطروحة دكتوراه – كلية التربية (ابن الهيثم) جامعة بغداد .

A systematical study about the genus *Lycopus* L. (Labiatae) in Iraq

*Maysoon Kh. Al-Bayati**

* Biotechnology Department, College of science, Baghdad University

ABSTRACT

The study included gross morphology and pollen of plants – which collected during field trips , and dry ones for most specimen preserved with the Iraqi herbaria – related to the genus *Lycopus* L. , and to identify the unidentified species and rectify the error there in , so according to that the species *L. europaeus* L. only were specified for the genus . Through this work the varity *L. europaeus* var. *glabrescens* Schmidely were found at the first time , and suggested to record anew for Iraq .

Pollen were of medium size, and had an ellipsoid shape in the equatorial view , and hexagonal in the polar view.

The ecological and soil quality where these genus plants grows were specified , and were geographically distributed on natural Iraqi territories for each one .Plate was made from many pictures in addition to the map for geographical distribution.